

NOVEDAD NOMENCLATORIAL EN VERBENACEAE II¹MARÍA E. MÚLGURA DE ROMERO ²*Instituto de Botánica Darwinion, Casilla de Correo 22, B1642HYD, San Isidro, Argentina.**E-mail: mmulgura@darwin.edu.ar*

ABSTRACT: Múlgura de Romero, M. E. 2001. Nomenclatorial novelty in Verbenaceae II. *Hickenia* 3(25): 91-92.

New combination *Lippia alba* var. *lanceolata* is given.

Key words: Verbenaceae, *Lippia*, Taxonomy.

RESUMEN: Múlgura de Romero, M. E. 2001. Novedad nomenclatorial en Verbenaceae II. *Hickenia* 3(25): 91-92.

Se establece la siguiente nueva combinación: *Lippia alba* var. *lanceolata*.

Palabras clave: Verbenaceae, *Lippia*, Taxonomía.

Al tratar las especies del género *Lippia* L. para el proyecto Flora Fenerogámica Argentina, se consideró que *Lippia lorentzii* Moldenke, (Troncoso, 1952; Moldenke, 1978; Múlgura de Romero, 1999) corresponde a una variedad de *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br., por lo tanto se propone una nueva combinación para este taxón:

Lippia alba* (Mill.) N.E. Br. var. *lanceolata (Griseb.) Múlgura, comb. nov. *Lippia geminata* Kunth var. *lanceolata* Griseb., Symb. fl. argent.: 278. 1879. *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze var. *lanceolata* (Griseb.) Kuntze, Rev. gen. plant. 3(2): 252. 1898. TIPO: Argentina. Salta: Orán, Dragones, VIII-1873, *Lorentz & Hieronymus 580* (holotipo, GOET, no visto; isotipo, CORD).

Lippia globiflora (L'Hér.) Kuntze var. *lanceolata* (Griseb.) Kuntze f. *incana* Kuntze, Rev. gen. plant. 3(2): 252. 1898.

TIPO: Argentina: Orán, *Hieronymus s.n.* (holotipo, NY, no visto).

Lippia chacensis Moldenke, Phytologia 2: 414. 1948. TIPO: Bolivia. Gran Chaco, Tatarenda, 22-III-1902, *Fries 1445* (holotipo, S, no visto; isotipo, NY).

Lippia lorentzii Moldenke, Phytologia 2: 415. 1948. TIPO: Argentina. Salta: Orán, Dragones, Mitte VIII-1873, *Lorentz & Hieronymus s.n.* (holotipo, S, no visto; isotipo, CORD), syn. nov.

Distribución geográfica y hábitat: esta variedad crece en la provincia biogeográfica Chaqueña, desde Bolivia y Paraguay hasta el norte de Argentina (Salta, Corrientes), floreciendo en primavera.

Observaciones: la similitud con la var. *alba*, de la que se diferencia por sus hojas elípticas y de menor tamaño, fueron los factores que determinaron el cambio de status de este taxón.

Los sinónimos enumerados ya habían sido aceptados con anterioridad por Troncoso (1952) y por Moldenke (1978).

¹ Botta, S. M., Martínez, S. & Múlgura de Romero, M. E. 1995. Novedades nomenclatoriales en Verbenaceae. *Hickenia* 2 (28): 127-128.

² Miembro de la Carrera del Investigador, CONICET.

BIBLIOGRAFÍA

Moldenke, H. N. 1978. Additional notes on the genus *Lippia*. VIII. *Phytologia* 39: 162-182.

Múlgura de Romero, M. E. 1999. Verbenaceae, en F. O. Zuloaga & O. Morrone (eds.), Catálogo de las Plantas Vasculares de la República Argentina II. Dicotiledóneas. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Garden* 74: 1136-1170.

Troncoso N. S. 1952. Descripción de algunas especies nuevas o críticas de «*Lippia*» de la Flora Argentina. *Darwiniana* 10: 69-89.

Original recibido el 2 de noviembre de 2000; aceptado el 7 de marzo de 2001.