

NOTA ACLARATORIA

SOBRE LA PRESENCIA DE *NYMPHAEA CAERULEA*
(NYMPHAEACEAE) EN LA ARGENTINA

NUNCIA M. TUR

*División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata,
Paseo del Bosque s/n°. 1900, La Plata, Argentina. E-mail: tur@fcnym.unlp.edu.ar*

En Tur (2003) se citó por error *Nymphaea elegans* Hook. (Nymphaeaceae) para la flora Argentina. De acuerdo con las observaciones hechas por el Dr. John Wiersema (com. pers.) y según Fedes & Amaral (2003), el material citado corresponde a:

Nymphaea caerulea Savigny, *Ann. Mus. Natl. Hist. Nat.* 1: 366-371. 1802.

Asímismo Wiersema (com. pers.) menciona que "*Nymphaea caerulea* se encuentra en el este y sur de Brasil (en los Estados de Minas Gerais, Rio do Janeiro, São Paulo y Paraná) y en el sureste de Paraguay, en el departamento Canindeyú. Por el contrario *N. elegans* es una especie del sur de Estados Unidos y el oeste de México, de la cual no se conocen registros para otros países, además de estar poco adaptada para colonizar nuevos habitats."

Nymphaea caerulea se distingue de *N. elegans* porque posee manchas oscuras en la parte inferior de la hoja y por la mayor longitud de los apéndices de los estambres.

La especie es nativa de Africa y se encuentra como subespontánea en Brasil, Paraguay y ahora en la Argentina.

BIBLIOGRAFÍA

- Fedes, F. & M. do Carmo E. Amaral. 2003. Nymphaeaceae. En M. G. L. Wanderley, G.J., Shepherd, T. S. Mehem, A. M. Giuliatti & M. Kirizawa (eds.) *Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo* 3: 242-245.
- Tur, N. M. 2003. *Nymphaea elegans* (Nymphaeaceae) nueva cita para la flora Argentina. *Hickenia* 3(42): 167-169.